

ALLERGIES ALIMENTAIRES = PLAN D'ACTION EN URGENCE

PAI

ENFANT :

POIDS : KG

AGE :

ASTHMATIQUE avec traitement de fond : OUI (risque de réaction plus sévère) NON

ALIMENT(S) A EXCLURE : Protéines du lait de vache et du lait des autres mammifères, Arachide (= cacahuète), Fruits à coques, noix de Cajou, Pistache, Noisette, Œuf en tant que tel et œuf cru

Les aliments à étiquetage préventif (peut contenir des traces..., fabriqué dans un atelier qui utilise...) **sont autorisés**. L'huile d'arachide est **autorisée**.

PENDANT OU JUSTE APRES AVOIR MANGE : J'OBSERVE

- Ma bouche pique ou gratte, mon nez coule
- Mes lèvres gonflent
- J'ai des plaques rouges qui grattent
- J'ai un peu mal au ventre et envie de vomir

**MAIS JE PARLE ET RESPIRE BIEN
MON ALLERGIE COMMENCE**

JE PREVIENS QUELQU'UN



DONNER LE TRAITEMENT D'URGENCE

Les médicaments sont dans ma trousse :

Desloradatine (Aerius) :

**SURVEILLER L'ENFANT
PREVENIR LES PARENTS**

**SI J'OBSERVE d'AUTRES SIGNES: VOIR
CI DESSOUS**

SI J'AI UN OU PLUSIEURS DES SIGNES SUIVANTS

- Ma voix change
- Je tousse, je siffle, je respire mal
- J'ai très mal au ventre, je vomis
- Je fais un malaise, je me sens bizarre, je me gratte les mains, les pieds, la tête.

**ATTENTION CELA PEUT ÊTRE GRAVE
FAITES POUR MOI LES BONS GESTES**



Injecter : JEXT Stylo 0,15 mg/0.30 mg.

(mode d'emploi dans ma trousse et au verso)

+ Salbutamol (Ventoline) :

bouffées à répéter toutes les 10 minutes avec la chambre d'inhalation

- Prednisolone (Solupred) Oro 20 mg

comprimés
à faire fondre sous la langue ou à dissoudre dans un peu d'eau

Appeler le 15
surveiller l'enfant

SURVEILLANCE : Noter l'heure d'administration des médicaments

-En cas de réaction sévère avec malaise : allonger l'enfant sur le dos, jambes surélevées

-En cas de réaction avec gêne respiratoire : mettre l'enfant en position semi assise

-En cas de contact ou d'ingestion d'un aliment interdit sans réaction : surveiller l'enfant. Noter l'heure, informer les parents


Attention, ma trousse doit toujours être avec moi ou accessible

Dr Crassard


Centre hospitalier de Bourg en Bresse le :

Mode d'emploi du stylo JEXT


Prendre le stylo injecteur Jext dans la main dominante (celle qui est utilisée pour écrire) avec le pouce le plus près possible du bouchon jaune



Retirer le bouchon jaune avec l'autre main.



Placer l'extrémité noire du stylo injecteur contre la face extérieure de la cuisse, tenir l'injecteur à angle droit de la cuisse (environ 90°).



Presser fermement l'extrémité noire contre l'extérieur de la cuisse jusqu'à entendre le déclic confirmant le début de l'injection, le maintenir en position. Tenir fermement l'injecteur en place contre la cuisse pendant 10 secondes puis retirer.



Masser la zone d'injection pendant 10 secondes.

